

FNAT

Fnat kan ramme alle!

Patientinformation

Vi har igennem det sidste år oplevet et boom i antallet af tilfælde med fnat.

Fnat smitter ved tæt kontakt, men det er relativt nemt at behandle, hvis man gør det korrekt.

Symptomerne på fnat er kløe, røde knopper, små væskefyldte blærer og evt. kan der ses små midengange.

Har du mistanke om, at du er blevet smittet med fnat, skal du kontakte egen læge, der kan stille diagnosen og iværksætte behandling.

Fnat behandles med creme Permethrin 5 % (NIX/Permethrin, fås i håndkøb på apoteket).

Vi følger de europæiske retningslinjer, der pt. er lidt anderledes ift. de retningslinjer, man ellers kan finde på andre officielle hjemmesider.

Hvis din læge konstaterer du har fnat, skal du gøre følgende:

1. Påføre cremen på hele kroppen, undtaget øjen- og mundomgivelser og dette skal du gentage efter 7 dage.
2. Morgenen efter behandling, vaskes tøj, sengetøj og håndklæder ved 60 grader eller forsegles i en plasticpose i en uge. Har du stofmøbler, skal disse stilles til side en uge, for at være sikker på at der ikke er levende mider.

Det er vigtigt at alle i husstanden /alle tætte kontakter behandles og behandles samtidig, for at undgå at man smitter hinanden på ny.

Man kan godt have fnat, selvom man endnu ikke har symptomer.

Kløe og nye knopper kan fortsætte, i op til 4 uger efter korrekt behandling.

Husk det er ingen skam at have fnat. Det er vigtigt at informere alle de personer, man er- eller har været i tæt kontakt med, så de også kan blive behandlet.